



Подготовка к ультразвуковому исследованию предстательной железы (трансабдоминально и трансректально)

Подготовка к трансабдоминальному осмотру предстательной железы

- ✓ Исследование проводится на умеренно наполненный мочевой пузырь.
 - 🕒 **За 1 час до УЗИ необходимо выпить 0,5- 1 литр** (в зависимости от индивидуальной скорости наполнения мочевого пузыря) воды без газа, либо возможно воздержание от мочеиспускания, чтобы к назначенному времени осмотра было чувство умеренного желания к мочеиспусканию.
-
- ❗ **Важно!** Мочевой пузырь не должен быть переполнен, это уменьшает информативность исследования, как и мало наполненный мочевой пузырь.
-

Подготовка к трансректальному осмотру предстательной железы

- ✓ Накануне исследования необходимо очистить прямую кишку при помощи утреннего стула или клизмы.
 - ✓ Прибыть на исследование с умеренно наполненным мочевым пузырем.
 - 🕒 **За 1 час до УЗИ необходимо выпить 0,5- 1 литр** (в зависимости от индивидуальной скорости наполнения мочевого пузыря) воды без газа, либо возможно воздержание от мочеиспускания, чтобы к назначенному времени осмотра было чувство умеренного желания к мочеиспусканию.
-
- ❗ **Важно!** Мочевой пузырь не должен быть переполнен, это уменьшает информативность исследования, как и мало наполненный мочевой пузырь.
-

При себе необходимо иметь:

- направление от лечащего врача;
- результаты предыдущих обследований;
- медицинские документы о перенесенных операциях, касающихся области осмотра, результат анализа крови на ПСА (при наличии), так как это повышает точность и информативность исследования.

Единый колл-центр:

☎ +7 (383) 362-02-00

🌐 zdravitsa.ru

