



Рекомендации пациентам после протезирования несъемными конструкциями

Для сохранения долгосрочного положительного результата ортопедического лечения рекомендуется соблюдать определенные правила, которые помогут снизить количество вынужденных обращений к врачу:

1. Несъемные зубные протезы следует очищать зубной щеткой с пастой так же, как естественные зубы, 2 раза в день. После еды полость рта следует полоскать для удаления остатков пищи.

Если при чистке появляется кровоточивость, не прекращайте гигиенические процедуры; если кровотечение сохраняется в течение недели, обратитесь к своему стоматологу.

2. При фиксации протеза на временный цемент не рекомендуется жевать жевательную резинку и другие вязкие пищевые продукты.

3. Во избежание поломки протеза, скола облицовочного материала, повреждения слизистой оболочки полости рта не рекомендуется принимать и пережевывать очень жесткую пищу (сухари, карамель, грызть кости), откусывать от больших кусков (яблока).

4. При скоплении пищи под протезом (искусственным зубом) следует использовать флосс с утолщенной средней частью (суперфлосс).

5. Безотлагательно обращайтесь к своему врачу в следующих случаях:

- **нарушение фиксации** несъемного протеза (признаки нарушения фиксации: «хлюпанье» протеза, неприятный запах изо рта);
- **сколы** керамических элементов;
- **болезненные ощущения** в области протезирования, воспаление десны вокруг коронки (кровоточивость десны);
- **нарушение смыкания**, завышение прикуса в области коронок.

Единый колл-центр:

 +7 (383) 362-02-00

 zdravitsa.ru